

עלון לצרכן מיועד לבעלי רישיון לקנאביס רפואי

קנאביס רפואי Femmican

חומרים פעילים

בצמח הקנאביס קיימות למעלה מ-500 תרכובות כימיות. החומרים הפעילים מסווגים לפי ריכוז קנבינאידים: סוג CBD ו-THC (בהתאם לרישום על גבי האריזה).

ידועים כיום גם מרכיבים נוספים הקראים קנופידים, להם מנגוני פעולה נבדלים היוצרים טריג'רה (הידועה כ'לאקט הפמלה') עם קנבינאידים. שילוב של מבטא בתכונות טריג'רה כגון: שינוך כאב, שיפור במצבי הרהר, הפחתת פעילות דלקתית, שינה איכותית ועוד.

כנה להיום מותאמים המוצרים לכל מטופל לפי ריכוז חומרים פעילים ואופי ההרכב (סאטיבה/אינדיקה או היברידי').

מוצרי Femmican מועשרים בטרפנים להשגת אפקט מיטבי של טיפול בקנאביס רפואי.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש במוצר. עלון זה מכיל מידע תמציתי על המוצר. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הצוות הרפואי.

בשימוש ראשוני ובכל שאלה המגעת לשימוש בקנאביס רפואי

מומלץ ליצור קשר עם מערך ההדרכה של חב' בזלת פארמה בטל. 072-2211500

מוצר זה נרשם עבורך. אין להעבירו לאדם אחר. הוא עלול להזיק להם אפילו אם נראה לך כי צמצם הרפואי דומה.

מוצר הקנאביס מוגדר כסם מסוכן שחל לגביו איסור שימוש אלא אם ניתן לדבר רישיון כדין. החזקה ומוקש שימוש בקנאביס למטרות רפואיות הם בהתאם לתקנות היחידה לקנאביס רפואי מטעם משרד הבריאות. (אסמנתא 48046317 בעדכון נתמי רישיון החזקה ומוקש שימוש בקנאביס למטרות רפואיות- היחידה לקנאביס רפואי, משרד הבריאות)

חל איסור מוחלט על שימוש בסם מסוכן בנוכחות קטינים או בפומבי.

אין להוציא סם מסוכן או מוצריו מישראל ללא אישור מיוחד.

יש לקרוא ולהקפיד על ההגבלות ונתמי הרישיון כמנועו ברישיון השימוש והאחזקה של המטופל.

עלון זה אינו מהווה תחליף לשיחה עם הרופא, הרוקח או נציג מרכז ההדרכה.

1. למה מיועד קנאביס רפואי?

ההתוויות הרפואיות הן תחת ההתייאויות הרלוונטיות כמפורט בנהל 106 של היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות.

2. לפני השימוש בקנאביס רפואי

א אין להשתמש במוצר אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכיל המוצר, או שפיתחת רגישות במהלך השימוש במוצר.
- אתה בהיריון, מתכננת היריון או מיניקה.
- אתה סובל מפסיכיהז פעילה או תורשה משפחתית (מדרגה ראשונה) של מחלות פסיכיות.
- אין להשתמש במוצר זה בחושך.

! אזהרות מיוחדות לנוגעות לשימוש במוצר:

- חולי סוכרת** - רגיכות קנאביס עלולה לגרום לירידה בערכי הסוכר בדם. מומלץ להצטייד בחיטוי או ממחך לז' במשקה קל צונן ומומנות לפני תחילת השימוש. מומלץ בלצע ניטרון רמות סוכר בתחילת השימוש.
- לחולים הסובלים מסרטן בכבד** (Hepatoma) - מומלץ לא להשתמש במוצר קנאביס המכיל THC.
- שימוש מדויק (abuse) ופיתוח סבילות/ התמכרות לקנאביס** - יש לעדכן צוות רפואי אם הנהך נחלק למנות הולכות וגדלות של קנאביס כדי לשפר את מצבך הרפואי.

לפני הטיפול בקנאביס ספר לרופא אם:

- הנהך סובל ממחלת לב וכלי דם חמורה כגון: אי-ספיקת לב, תעוקת חזה, התקף לב בעבר, לחץ דם גבוה שאינו נשלט או בעיה עם קצב הלב או הודפוק או באם השינויים בדופק הלב בלחץ הדם נצפו לאחר תחילת הטיפול.
- הנהך סובל ממחלת כבד או כליות.
- אתה סובל מפסיכיות/פעילות, או שחווית מצב פסיכיותי בעבר.
- יש לך הפרעה הרדתית.
- יש לך תורשה פסיכיאטרית משמעותית בקרוב משפחה מדרגה ראשונה, במיוחד אם גילך נמוך מ-30.
- יש לך היסטוריה של התמכרות לתרופה או לחומר כלשהו או של שימוש לרעה בסמים.
- הנהך מתקשה בביצוע פעילויות יומיומיות כגון הכנת מזון ומשקאות חמים.
- יש לך סכיזופרניה או הפרעה בפיולריות (דו-קוטבית).
- אם הנהך נוטל תרופות נוספות או תוספי תזונה.

בדיקות ומעקב

- מתן רישיון יותנה ביצוע מעקב רפואי, מדי בלושון בדשים לפחות בשנת הטיפול הראשונה, על ידי רופא מטפל שפרטיו יכללו מעקב והחלי משנת הטיפול השנייה - לפחות כל שישה חודשים.
- אם אתה נוטל לפרנאט (טיפול באפילפסיה), יחד עם הקנאביס, מומלץ גם לעקוב אחר תפוקוד הכבד בעת השימוש המשולב עם קנאביס.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח טרם השימוש. הרופא יאמוד את גודל הפרוטנציאל לאינטראקציות, ייקבע האם לתוצאה משמעות קלינית הדרושת התייחסות בטרם יאשר את הכביט המשולב, יורה על מעקב, התאמת מינוים, הפסקת טיפול או על אמצעי זהירות אחרים. **דווח לרופא במיוחד אם אתה לוקח:**

- תרופות המדכאות את מערכת העצבים המרכזית,** למשל תרופות להפרעות שינה, להרגעה, מגדוות חרדה ולהפרעות פסיכיות. משככי כאב (בפרט משככי כאבים אופייטיים) - תרופות אלו עלולות להגדיל את השפעות ההרגעה והרפיית השרירים ולהוביל לעלייה בסיכון לפגילות ותאונות אחרות. שימוש יחד עם אופיאטים יכול גג להביא לעלייה בסיכון לדיכוי הנשימה.
- תרופות מרפוח שרירים** כגון בקלופן או בבוזידאפינים. עלולה להיגרם ירידה בחוזק וכוח השריר, חרדה או פרנויה (עלייה בחרדה או פחד), שינויים בקצב הלב המלווים בלחץ דם נמוך (תחושת סחרחורת כשקמים).
- אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע/שאף ילד מן המוצר, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת המוצר אתך. לאחר נטילת יתר יש להיפגש עם הרופא לצורך מוּעָב. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.
- תרופות להורדת לחץ דם** - ייתכנו ירידת יתר בערכי לחץ הדם וצורך בהתאמת מינון עם התחילת או שינוי הטיפול בקנאביס.
- תרופות להורדת לחץ דם** - ייתכנו ירידת יתר בערכי לחץ הדם וצורך בהתאמת מינון.

- תרופות בעלות סימפתומיטי** (כולל תכשירים לטיפול מקומי בעין או באף שהינם בעלי פוטנציאל של ספיגה סימטית) - הסיכון להפוגעת טכיקרדיה או לעלייה בלחץ הדם יכול לעלות.
- נוגדי קרישה המכילים וארפרין (קומדיון - תיתכן עלייה במדדי INR.
- תכשירים מקומיים להורדת לחץ תוך עיני (גלאוקומה).
- תרופות להגברת האון המיני** - תיתכן עלייה בסיכון להתקפי לב.
- אנטיביוטיקה לטיפול בזיהומי עור - מוצצה פוסדית.
- תרופות לטיפול ב-HIV.
- תרופות לטיפול באפילפסיה** - ולפרואט, טופיראמט, רופינמיד, קולבאזם, זוניסמיד, קרבמזפין.
- תרופות עם אפטיקים אנטיכולינרגים** (למשל נוגדי דיכאון טריציקליים, נוגדי היסטמין שבשימוש נגד אלרגיה) - ייתכנו עלייה בפוטנציאל הפוגעת טכיקרדיה, סחרחורת ומניח.
- אזלאסטין** - לטיפול באלרגיה בעיניים.
- תכשירי אמפטמינים או נגזרותיהם** - תכשירים להרזיה, להפרעת קשב וריכוז ואף טיפולי שיינים (אדרנלין שלעיתים משמש להרדמה) - עלולים לגרום לעלייה בלחץ דם וקצב לב מהיר.

- פירוט נוסף של תרופות שיכולות להשפיע, או להיות מושפעות מתהליך הפירוק של קנאביס בגוף:

ברביטורטים, קרבמזפין, אנדלוטמיד, פנוברבטיל, פניטואין, פרימידון, ריפובידון, ריפמיטין, ריפמינס, היפריקום, קלרטרמיצין, זיקלופפרין, דאראנאויר, אריתרומיצין, אטרקוונזול, לופינאויר, מיפפריסטון, אומבסטוויה, פרטאסופור, ריטונאויר, סאקווינאויר, ורפמיל, ווריקונזול, אמידארון, קלופידוגרל, פלוקונאזול, פלואורואראציל, טטרונידזול, סולפמוקסזול, כלורמפניקול, פאנוירנה, אזמפרזול, פלואוקסטין, פלובוקסמין, אזוניאזיד, מודיפילין, אומפרזול, אוקסקרבפין, תאופילין, קפאין, דזלוקסטין, אסטרוידיל, אסטרוגן, לידוקאין, מלטונין, מקסילטין, מירטפאן, אולנזפין, רופרוחמול, רטג'ילין, רופינרול, טריאמטן, זולמיטריפטאן.

מאחר שהמידע על שילוב בין קנאביס רפואי לתרופות עדיין אינו מבוסס מספיק על מחקרים רפואיים מסודרים, בכל מקרה בו אתה נתקל בתופעת לוואי, שעשויה להיגרם משילוב כלשהו עם תרופה, תוך כדי שימוש בקנאביס רפואי מומלץ לדווח לרופא ולנהוג במשנה זהירות.

אם הנהך נוטל תרופה כלשהי אין להפסיקה או לשנות מינונה ללא יעוץ רופא.

שימוש במוצר ומזון

- יש להימנע משתיית מיץ שאכוליות בתקופת השימוש בקנאביס.
- מומלץ לאכול ארוחה קלה כחצי שעה **לאחר** נטילת המוצר.
- צריכת קנאביס עלולה לגרום לירידה בערכי הסוכר בדם ולתחושת עייפות וסחרחורת. רצוי לא לטיל קנאביס על בטן ריקה. מומלץ להצטייד בחטיף או ממתק או במשקה ממותק **לפני** נטילת המוצר.

שימוש במוצר וצריכת אלכוהול

אין לשמות יניוּת או משקאות חריפים בתקופת הטיפול בקנאביס, במיוחד בתחילת הטיפול או כאשר משנים את המוצר/מינון. שתיית אלכוהול בזמן הטיפול בקנאביס עלולה להגביר השפעות שונות כגון סחרחורת, נמנום, איבוד שיווי משקל או פגיעה במהירות התגובה, ובכך לפגום ביכולת לנהוג ולהפעיל מכונות ולהעלות את הסיכון לפגילות ותאונות אחרות.

היריון, הנקה ופוריות

- אין להשתמש בקנאביס אם הנהך בהיריון, מתכננת להרות או מיניקה.
- על שיש גברים להשתמש באמצעי מניעה יעיל נגד היריון בזמן הטיפול בקנאביס הרפואי ובמשך שלושה חודשים לפחות לאחר הפסקת הטיפול.
- בשימוש במהלך היריון ייתכן משקל יילוד נמוך.
- פריון - תיתכן ירידה בספירה ותנועתיות הזרע בגברים ופגיעה בקליטת העובר בנשים.
- אם הנהך בהיריון או מיניקה יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופות.

נהיגה ושימוש במכונות

- מחקרים מצגים שלחומרים הפעילים בקנאביס השפעה על זמני תגובה, הערכת זמנים ומרחקים ותפיסה מרחבית.
- הוראות נהיגה ושימוש במכונות הן בהתאם לתקנות התעבורה בישראל (סמים שאינם נחשבים סמים מסוכנים), התשע"ח-2018. יש לפעול לפיהם.**
- ילדים - יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

3. כיצד תשתמש במוצר?

יש להשתמש במוצר במיד המבטא בהוראות הצוות הרפואי. עלִיך לבדוק עם הרופא, הרוקח או נציג מרכז ההדרכה אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול במוצר. המינון ואופן השימוש יקבעו על ידי הרופא בלבד. רצוי, ככל הניתן, להגיע לאיזון בטיפול בתרופות הכרוניות לפני תחילת השימוש בקנאביס רפואי.

המינון היומי הנו אישי מאוד לכל מטופל ומוצרין התאמה באמצעות תהליך ניטור של המינון בתוך שעות (המינמה) העלאת מינון הדרגתית במטרה להגיע למינון הנמוך ביותר המאזין בין תועלת רפואית משמעותית ותופעות לוואי מינימליות).

סבלנות! תהליך ההגעה למינון אופטימלי עשוי לקחת שבועות ואף יותר.

תחילת השימוש במוצר הקנאביס הרפואי:

- מומלץ להתחיל את השימוש בקנאביס הרפואי כאשר נמצאים בבית.
- מומלץ להתחיל את השימוש בקנאביס בפעם הראשונה באווירה ניטחה ובנוכחות מבוגר אחראי נוסף.
- יש להתחיל במינון מינימלי ולעקוב אחר ההשפעה. רצוי לנהל טבלת מעקב.

אופן השימוש

שמן קנאביס רפואי

- יש לטילול את השמן לאחר ארוחה קלילה (פרי או כריך קטן) כדי למנוע ירידה ברמת סוכר.
- יש לטפטף את המספר הטיפות הרצוי לתוך כפית. את הבקבוק יש להחזיק אנכית (90 מעלות) לכפית לטפטוף מדויק.
- שמן הקנאביס הינו מזל צמיגי ייתכן טפטוף איטי יחסית.
- יש להכניס את הכפית לפה **מתחת לשפתון** ולא להוציאה באיטיות.
- לאחר הטילה הכפית לפה 1-2 דקות לפני בליעת הרוק על מנת לתת לשמן להיספג.
- יש לחכות 15-20 דקות לפני ששותים או אוכלים. ההשפעה תורגש לאחר כחצי שעה עד שענה.
- ייתכן שהתועלת הרפואית תורגש רק לאחר מספר שבועות ולכן יש להקפיד על רצף טיפולי.
- לרוב נוטלים שמן כ-3 פעמים ביום. ייתכן שמספר הטיפות בכל נטילה ישתנה בהתאם למצב רפואי מידי יום או בהתאם לסוג השמן וריכוזו.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אין לעררב או להוסיף לתוכן מוצר הקנאביס אף חומר אחר. תוכן מוצר הקנאביס הרפואי הינו ראוי לשימוש וכל תוספת לו עשויה לפגוע בעילות הרפואית של הטיפול.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר אתה עלול לחוות תופעות הרעלה חמורות הכוללות סחרחורת, ושינויות בבלול, הזיות (הלוצינציות - ראייה או שמיעה של דברים שאינם קיימים) ואמונה בדברים שאינם נכונים (דלוזיות), חרדה או פרנויה (עלייה בחרדה או פחד), שינויים בקצב הלב המלווים בלחץ דם נמוך (תחושת סחרחורת כשקמים).

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע/שאף ילד מן המוצר, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת המוצר אתך. לאחר נטילת יתר יש להיפגש עם הרופא לצורך לצורך מוּעָב. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.

אם שנתת לטילול את המוצר בזמן המייעוד, אין לטילול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

<p>Each Drop Contains</p> <p>כל טיפה מכילה</p> <p>كل نقطة تحتوي على</p>	IMC - Medical Grade Cannabis Oil					
	שמן קנאביס רפואי					
	زيت الحشيش الطبي					
			THC %	CBD %	CBN %	
T0/C24	CBD Rich	Sativa/Indica	0	24	<1.5	<0.16
T1/C20	CBD Rich	Sativa/Indica	1	20	<1.5	0.32
T3/C15	CBD Rich	Sativa/Indica	3	15	<1.5	0.96
T5/C10	CBD Rich	Sativa/Indica	5	10	<1.5	1.6
T10/C10	THC/CBD Balanced	Sativa/Indica	10	10	<1.5	3.2
T5/C5	THC/CBD Balanced	Sativa/Indica	5	5	<1.5	1.6
T10/C2	THC Rich	Sativa/Indica	10	2	<1.5	3.2
T15/C3	THC Rich	Sativa/Indica	15	3	<1.5	4.8
T20/C4	THC Rich	Sativa/Indica	20	4	<1.5	6.4
T20/C4	THC Rich	Sativa/Indica	20	4	<1.5	6.4

Other ingredients: olive oil, cannabis terpenes < 2%

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

החזקה ומוקש שימוש:

על המטופל לשאת את הרישיון עמו יחד עם אריזת מוצר מקורית בכמות שלא תעלה על אריזה אחת או על כמות חודשית מותרת לפי הרישיון (הנמוך מבין השניים).

אין להשתמש בנוכחות קטינים.

אין לשאת לחול'ל או להשתמש באזורי מסכ/שדות תעופה ונמלים.

בעת שאשפי - ניתן להשתמש רק לאחר אישור צוות רפואי ובמקום המאושר ע"י הצוות.

הפסקת שימוש:

יש להיוועץ ברופא לפני החלטה על הפסקת השימוש בקנאביס לאחר שימוש קבוע.

הפסקה פתאומית של השימוש עלולה להשפיע על השינה, התיאבון או הרגשות. ייתכן שיופיעו תסמיני גמילה הכוללים: אי שקט, עצבנות, כאבי ראש, חרדה, דיכאון, סף גירוי נמוך, קשיי ריכוז, חוסר שינה, הפרעות בתיאבון, כמיהה לשימוש בסם. על כן, בכדי למנוע תסמיני גמילה ומוקזה, בהחלטה על הפסקת הטיפול בקנאביס, הרופא שלך ינחה אותך כיצד עליך להפחית באופן הדרגתי את השימוש עד להפסקה מוחלטת.

אין לטילול מוצר זה בחושך! בדוק את התוויות והמנה בכל פעם שהנהך לוקח מוצר זה.
הרכב משקפיים אם הנהך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש במוצר, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

השימוש בקנאביס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסביל מאף אחת מהן. רוב תופעות הלוואי יפסקו לאחר הסתגלות ראשונית למוצר.

תופעות לוואי שכיחות:

- חולשה, סחרחורות או תחושת ריחוף
- דופק לא יציב, דפיקות לב
- ירידה ברמת סוכר או/ו בלחץ דם
- תיאבון מוגבר
- קואורדינציה לקויה, חוסר יציבות, פגיעה בריכוז
- עייפות ותחושת נמנום
- תופעות לוואי בשימוש ארוך/כרוני:

- תלות, התמכרות או שימוש לרעה
- ירידה בהורמוני פרולקטין, LH, FSH-GH
- הפרעות במאזן אלקטרוליטים. זהירות נדרשת בחולי אי ספיקת כליות
- הפרעות פסיכיות במטופלים להם עבר אישי או היסטוריה משפחתית של תופעות אלו.
- תופעות לוואי נוספות המתוארות בספרות ושיחות אינה ידועה:**
- תגובה אלרגית, דלקת פרקים קנבינאידית, הפרעות בקצב הלב, אי ספיקת לב.
- ירידה בחום הגוף ובתנועתיות ובמקרים נדירים אף שיתוק, היפומאניה (אובדן כושר שפוטיו והתנהגות קלת דעת).
- תופעות לוואי הנובעות בדרך כלל ממינון יתר, הממייבות התייחסות מיוחדת:**
- עליון, שינויים גדולים בלחץ הדם, בדופק, ברמת הסוכר בדם או בקצב הנשימה. מינון גבוה של מוצר זה, עלול, במקרים מסוימים, אצל אנשים בעלי נטייה מוקדמת, לגרום להתפרצות זמנית של מצבים פסיכטיים, חרדה או הלוצינציות (הזיות).

אם הפגיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הצוות הרפואי.

5. איך לאחסן את המוצר?

- מנע הרעלה! מוצר זה וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים וילאי תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.
- אין להשתמש במוצר אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה/תווית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

נתנאי אחסון

- יש לאחסן את המוצרים באריזה/ בקבוק אטומים היטב, במקום חשוך ויבש, בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.
- מיעוי שמן הקנאביס טוב לשימוש כחודש מיום הפתיחה של הבקבוק.
- אין להשליך מוצר קנאביס לאשפה או לשפכים. יש לשאלו את הרוקח המנפק כיצד להשימד מוצר זה שאינו בשימוש.
- אין לאחסן עם תרופות/מוצרים רפואיים אחרים באותה אריזה.

6. מידע נוסף

יצרן: בזלת נחשותן בע"מ, ת.ד. 156, אור עקיבא.

בזלת פארמה

מרכז הדרסה ראיצ'י: 072-22-11-500

אתר אינטרנט: www.femmican.co.il

ביאשור משרד הבריאות

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, המוצר מיועד לנשים וגברים כאחד.

Patient leaflet For use only by Medical Cannabis permit holders

Medical Cannabis

Femmican

Active ingredients

There are over 500 chemical compounds in the cannabis plant. The most well-known and researched active ingredients in the cannabis plant are CBD and THC cannabinoids. Cannabis products are classified according to the concentration of these substances.

Other known components are called Terpenoids, with separate action mechanisms that create synergy (known also as the Entourage Effect) with cannabinoids.

This combination is expressed in medical properties, such as: pain reduction, reduction in anxiety, anti-inflammatory activity, quality of sleep, and more.

At present, the products are prescribed to each patient according to the concentration of the active ingredients, and character of the composition (Sativa/Indica, or Hybrid).

Femmican product line is terpene enriched for optimum effect of medical cannabis treatment.

Read the entire leaflet carefully before using this product. This leaflet contains concise information about this product. If you have any further questions, consult your doctor, pharmacist, or training center representative.

Prior to initial use or any other question it is recommended to contact Bazelet Pharma guidance service: 072-22-11-500

This product has been prescribed specifically for you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if it seems to you that their medical condition is similar to yours.

The Cannabis product is classified as a controlled substance; using it is prohibited unless it has been legally licensed. Possession of cannabis and the place it is used for medicinal purposes are regulated by the Ministry of Health Medical Cannabis Unit. (Reference 48046317: Revised conditions for license to possess and place of use of cannabis for medicinal purposes - Medical Cannabis Unit, Ministry of Health).

Using a Controlled substance in the presence of minors or in public is strictly prohibited.

Do not take a dangerous drug or any of its products out of Israel without special permission.

Read and follow the restrictions and license conditions listed on your patient license for using and possessing the product.

This leaflet is not a substitute for a conversation with your doctor, pharmacist, or training center representative.

1. What is medical cannabis intended for?

نشرة للمستهلك معد لأصحاب رخصة لقب طبي

قنب طبيّ Femmican

مواد فعّالة

في نبات القنب يوجد أكثر من 500 مركبات كيميائية. المواد الفعّالة تصنف حسب تركيز الكنبائويديم THCو CBD (اعتمادا للمنتوك على العبوة).

يُعرف أيضًا اليوم بمكونات أخرى تسمى Terpenoids لها أجهزة عمل مختلفة تؤدي إلى خلق تآزر (يُعرف باسم "entourage") مع الكنبائويديم. هذا المزيج يبرز في الخصائص الطبية مثل: تخفيف الآلام، تحسين القلق، انخفاض النشاط الانتهائى، النوم الجيد وغير ذلك الكثير.
حاليا، يتم تصنيع المنتجات لكل مريض وفقا لتركيز المكونات النشطة وطبيعة التكوين (Sativa/Indica or Hybrid).
منتجات سلسلة FEMMICAN مخصين بالترينبات للحصول على أفضل تأثير لعلاج القنب الطبي.

عند الاستعمال لأول مرّة ولكل سؤال يتعلق في استعمال القنب الطبيّ يوصى في استعمال القنب الطبيّ مع مركز الإرشاد التابع لشركة بازيلت فارما، على هاتف رقم 072-22-11-500

هذا الدواء وصف لك، لا تعطه للآخرين؛ لأنّه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحيّة.
مُنْتَج القنب معرّف كمخدر خطير الذي يُحظر استعماله إلا إذا أعطي لذلك ترخيص بشكل قانوني.
حياة ومكان استعمال القنب لأهداف طبّية هو بموجب أنظمة وحدة القنب الطبيّ التابع لوزارة الصحة (رقم مرجعي 48046317:
تحديث شروط رخصة الحياة ومكان استعمال القنب لأهداف طبّية – وحدة القنب الطبيّ، وزارة الصحة).
يُمنَع تمامًا استعمال مخدر خطير بوجود قاصرين أو بشكل علني.

يُمنَع إخراج مخدر خطير أو مُنتجاته من إسرائيل بدون إذن خاص.

يجب القراءة والاهتمام بالتفقييدات وشروط الترخيص كما يظهر في رخصة الاستعمال والامتلاك لدى المتعالج.
هذه النشرة لا تشكل بديلا لمحادثة مع الطبيب، الصيدلي أو مندوب عن مركز الإرشاد.

1. لمْ أعدَ القنب الطبيّ؟

دواعي الاستعمال الطّبيّة هي تحت الاستثناءات ذات الصلة المفصلة في البند 106 التابع لوحدة القنب الطبيّ في وزارة الصحة.

2. قبل استعمال القنب الطبيّ

✘ يُمنَع استعمال المُنتَج إذ:

- وُجدت لديك حساسية للمواد الفعّالة أو لأحد المركّبات الأخرى التي يحتويها المُنتَج، أو إذا تطوّرت لديك حساسية أثناء استعمال المُنتَج.
- كنت حاملا، تخططين أن تحملي أو مرضعة.
- كنت تعاني من ذهان نشط أو وراثة عائلية (من الدرجة الأولى) لأمراض ذهانية.
- يُمنَع استعمال هذا المُنتَج في الظلام.

! تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال المُنتَج:

مرض السكرى - قد يؤدي استهلاك القنب إلى هبوط في مستويات السكر في الدم. يوصى التزوّد بوجبة خفيفة أو حلوى أو مشروب خفيف بارد ومُحلى قبل البدء بالاستعمال. يوصى بإجراء مراقبة لمستويات السكر عند بدء الاستعمال.
للمرضى الذين يعانون من سرطان في الكبد (Hepatoma) – يوصى بعدم استعمال مُنتَج القنب الذي يحتوي على THC.

- إساءة الاستعمال (abuse) وتطوِير قدرة تحمّل/إدمان على القنب – يجب حثثة الطاقم الطبيّ إذا كنت تحتاج إلى جرعات متزايدة أكثر وأكثر من القنب لتحسين حالتك الطبية.

قبل العلاج باللقب أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني من مرض في القلب أو الأوعية الدموية مثل: قصور في عمل القلب، ذبحة صدرية، نوبة قلبية في السابق، ضغط دم مرتفع غير منضبط أو مشكلة في معدل وتيرة القلب أو النبض، أو إذا لوحظت تغييرات في النبض وفي ضغط الدم بعد بدء العلاج.
- كنت تعاني من مرض كبد أو كلي.
- كنت تعاني من ذهان فعّال، أو إذا أصبت في الماضي بحالة ذهان.
- كنت تعاني من اضطراب قلق.
- كانت لديك حالة نفسية وراثية خطيرة لدى قريب عائلة من الدرجة الأولى، خاصة إذا كنت تبلغ أقل من 30 عامًا.
- كان لديك تاريخ من الإدمان على الدواء أو مادة ما أو إساءة استعمال المخدرات.
- كنت تواجه صعوبة في تنفيذ فعّاليات يومية مثل تحضير الطعام والمشروبات الساخنة.
- كنت تعاني من ذهان أو اضطراب ثنائي القطب.
- كنت تتناول أدوية إضافية أو مكملات غذائية.

فحوصات ومتابعة

- يُستَطر إعطاء رخصة متابعة طبيّة كل ثلاثة أشهر على الأقل في سنة العلاج الأولى، من قبل طبيب معالج، الذي يتم شمل تقاضيله في الرخصة، وابتداءً من سنة العلاج الثانية – على الأقل كل ستة أشهر.
- إذا كنت تتناول فالبروات (لعلاج الصرع)، سوياً مع القنب، يوصى أيضاً بمراقبة أداء عمل الكبد أثناء الاستعمال المدموج مع القنب.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبيّة والمكملّات الغذائيّة فأخبر الطبيب أو الصيدليّ قبل الاستعمال.
ستقدّر الطبيب حجم الإمكانية لحدوث تفاعلات، وسيُحدّد إذا كان للنتيجة معنى سريري الذي يتطلب الاهتمام قبل أن يصادق على العلاج المدموج، أو سيطلب إجراء مراقبة، ملائمة الجرعات، إيقاف العلاج أو وسائل حذر أخرى.

أخبر الطبيب بشكل خاص إذا كنت تتناول:

- أدوية مُثبطة لجهاز الأعصاب المركزي**، مثل أدوية لاضطرابات النوم، للتهدئة، مضادة للقلق ولاضطرابات ذهانية، مسكّنات ألم (خاصة مسكّنات الألم الأفيونية). هذه الأدوية ممكن أن تزيد من تأثير التهدئة واسترخاء العضلات، وأن تؤدي على ارتفاع في خطر حالات السقوط وحوادث أخرى. الاستعمال سوياً مع المسكّنات الأفيونية ممكن أن يؤدي أيضاً إلى ارتفاع في احتمال كبت التنفس.
- أدوية استرخاء عضلي** مثل باكوفين أو **بنزوديازيبينات**. قد يحدث انخفاض في متانة وقوة العضل، الذي يؤدي إلى خطر مزيد لحالات السقوط.
- أدوية تخفض مستويات الجلوكوز في الدم** - قد يحدث انخفاض مفرط في قيم الجلوكوز في الدم، وحاجة إلى ملامة جرعاتها مع بدء العلاج أو تغيير الحياة باللقنب.

- أدوية تخفض ضغط الدم** – قد يحدث انخفاض مفرط في قيم ضغط الدم والحاجة لملائمة الجرعات.
- أدوية ذات تأثير محاي الودي** (وهذا يشمل مستحضرات لعلاج موضعي للعين أو الأنف التي هي ذات مقدرة امتصاص جهازي) – ازدياد احتمال ظهور حالة من تسارع دقات القلب (tachycardia) أو ارتفاع ضغط الدم.
- مضادات التخثر التي تحتوي على وارفارين (كومادين)** – من المحتمل حصول ارتفاع في مؤشرات INR.
- مستحضرات موضعية لخفض الضغط داخل العين (جلوكوما).**
- أدوية لزيادة القدرة الجنسية** – من المحتمل ازدياد خطر حدوث نوبات قلبية.
- مضادات حيوية لعلاج حالات العدوى الجلدية** - حمض الفوسيديك.
- أدوية لعلاج HIV.**
- أدوية لعلاج الصرع** – فالبروات، توپيرامات، روفيناميد، كلوبازام، زونيساميد، كاربامازيبين.
- أدوية ذات تأثير مضاد للكولين** (مثل مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، مضادات الهيستامين التي تُستعمل ضد الحساسية) – من المحتمل حدوث ارتفاع في احتمال ظهور تسارع دقات القلب (tachycardia)، دوار وهوس.

- أزيلاستين** – لعلاج الحساسية في العينين.
- مستحضرات أمفيتامينية أو مشتاقها** – مستحضرات لتخفيف الوزن، لاضطراب الإصغاء والتركيز وحتى علاجات الأسنان (أدزناين الذي يُستعمل أحيانًا للتخدير) – قد تؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم ووتيرة قلب سريعة.
- تفصيل إضافيّ لأدوية التي ممكن أن تؤثر، أو أن تتأثر من عملية تحلل القنب في الجسم:
 - تأريبتورتا، كزيامازيبين، انزالتاميد، فينوباربيتال، فنيوتين، بريמידون، ريفابوتين، ريفامبين، هيبريكوم، كلاريثروميسين، سايكلوسبورين، دارونافير، أريثروميسين، إيتراكونازول، كيتوكونازول، لوينافير، ميفيستون، أوميبتاسفير، پاريتابريفير، ريتونافير، ساكوينافير، فبرابميل، فوريكونازول، أمودارون، كلويدوجريل، فلوكونازول، فلوأورأوراسيل، ميترونيدازول، سالفاميثوكسازول، كلورامفينيكول، إيفافيرنز، أزيومپرازول، فلوأوكسيتين، فلوأوكسامين، إيزونيازيد، مودافينيل، أوميفرازول، أوكسكاربازيبين، ثيوفيلين، كافيين، كلوزابين، دولوكستين، أسترايول، استروجين، ليدوكاين، ميلاتونين، ميسكليتين، ميرتازابين، أولانزابين، بروبريفانولول، ريسبيجلين، روينيترون، تريامتيرين، زولميتريتان :
- نظرًا إلى أن المعلومات المتعلقة بدمج القنب الطبيّ مع أدوية لم يتم تأسيسها بعد بصورة كافية على دراسات طبية منتظمة، في كل حالة تواجه فيها عرضًا جانبيًا، الذي ممكن أن يكون ناتجًا عن أي دمج مع دواء، مع استعمال القنب الطبي، يوصى بإبلاغ طبيبك واتخاذ الحذر.

إذا كنت تتناول دواء معينًا، يُمنَع التوقف عن تناوله أو تغيير جرعته بدون استشارة طبيب.

استعمال المُنتَج والغذاء

- يجب الامتناع عن شرب عصير الجريبفروت خلال فترة استعمال القنب.
- يوصى بتناول وجبة طعام خفيفة، نصف ساعة تقريبًا بعد تناول المُنتَج.
- استهلاك القنب قد يؤدي إلى انخفاض في مستويات السكر في الدم وإلى شعور بالتعب والدوار. من المستحسن عدم تناول قنب على معدة فارغة. يوصى التزوّد بوجبة خفيفة/حلوى أو مشروب محلى قبل تناول المُنتَج.

استعمال المُنتَج واستهلاك الكحول

يُمنَع شرب النبيذ أو مشروبات كحولية خلال فترة العلاج باللقنب، خاصة عند بدء العلاج أو عند تغيير المُنتَج/الجرعة.
شرب الكحول أثناء العلاج باللقنب قد يزيد تأثيرات مختلفة مثل دوار، نعاس، فقدان التوازن أو إصابة في سرعة رد الفعل، مما يضعف القدرة على السباقة وتشغيل الماكينات ويزيد احتمال خطر حدوث حالات سقوط وحوادث أخرى.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

- يُمنَع استعمال القنب إذا كنت حاملا، تخططين أن تحملي أو مرضعة.
- يجب على النساء والرجال استعمال وسائل منع حمل ناجعة ضد الحمل أثناء العلاج باللقنب الطبيّ ولمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد إيقاف العلاج.
- عند الاستعمال خلال الحمل، من الممكن أن يكون وزن المولود قليل.
- خصوبة – من المحتمل حصول انخفاض في تعداد وحركة الحيوانات المنوية لدى الرجال وإصابة في استيعاب الجنين لدى النساء.

إذا كنت حاملا أو مرضعة، يجب أن تستشيري طبيب أو صيدلي قبل استعمال الأدوية.

السياقة واستعمال الماكينات

تبين الأبحاث بأن يوجد تأثير للمواد الفعّالة في القنب على أوقات رد الفعل، تقييم الأوقات والمسافات والتصوّر المكاني.

تعليمات السياقة واستعمال الماكينات هو بموجب أنظمة المواصلات في إسرائيل (مخدرات التي لا تعتبر مخدرات خطيرة)، 8102، **يجب العمل بموجها.**

- الأطفال – يجب تحذيرهم من ركوب الدراجات أو من اللعب بالقرب من الشارع وما شابه.

3. كيف تستعمل المُنتَج؟

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطاقم الطبي. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدليّ أو مع مندوب من مركز الإرشاد إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمنتج. الجرعة وطريقة العلاج سيحدّدهما الطبيب، فقط.

هنالك عدة أشكال لإعطاء القنب: التدخين، التبخر، خلاصة زيت.

من المفضل، قدر الإمكان، الوصول إلى توازن العلاج في الأدوية المُرّمنة قبل بدء استعمال القنب الطبيّ.

الجرعة اليومية هي أمر شخصي جدًا لكل متعالج ويحتاج إلى ملائمة عن طريق مراقبة الجرعة خلال ساعات اليوم (رفع الجرعة تدريجيًا بهدف الوصول إلى الجرعة الأقل، التي توازن ما بين نجاعة طبيّة كبيرة وأعراض جانبية دنيا).

الصبر! عملية الوصول إلى الجرعة الأمثل قد يستغرق بضعة أسابيع وحتى أكثر.

بدء استعمال مُنتَج القنب الطبيّ:

- يوصى بدء استعمال القنب الطبيّ أثناء التواجد في البيت.
- يوصى البدء في استعمال القنب اللمرّة الأولى في أجواء مريحة وبوجود شخص بالغ مسؤول إضافي.
- يجب البدء بالحد الأدنى من الجرعة ومراقبة التأثير. من المفضل إدارة قائمة مراقبة.

طريقة الاستعمال

زيت قنب طبيّ

يجب تناول الزيت بعد وجبة خفيفة (فاكهة أو ساندويش صغير) لمنع حصول انخفاض في مستوى السكر.
يجب تنقيط عدد القطرات المرغوب على ملعقة. يجب إمساك القنينة بشكل عامودي (90 درجة) من الملحقة للتنقيط بصورة دقيقة.

زيت القنب هو سائل لزج ويمكن أن يكون التنقيط بطيء نسبيًا.

يجب إدخال الملحقة في الفم تحت اللسان وإخراجها ببطء.

بعد التناول، يجب الانتظار تقريبًا، 2-1 دقائق قبل بلع اللعاب لإتاحة الإمكانية للزيت أن يُمتص.

يجب الانتظار 15 دقيقة تقريبًا قبل الشرب أو تناول طعام. سيتم الإحساس بالتأثير بعد نصف ساعة تقريبًا حتى ساعة.

من المحتمل أن يتم الإحساس بالتأثير فقط بعد بضعة أسابيع ولذلك يجب الحرص على استمرار علاجي. على الأغلب يتم تناول زيت، 3-4 مرات في اليوم تقريبًا. من المحتمل أن يتغير عدد القطرات في كل تناول بحسب حالة طبيّة فورية أو بحسب نوع الزيت وتركيزه.

يُمنَع تجاوز الجرعة الموصى بها.

يُمنَع خلط أو إضافة أي مادة إلى محتويات مُنتَج القنب. محتويات مُنتَج القنب الطبيّ ملائمة للاستعمال وكل إضافة له قد تسبّب ضررًا في النجاعة الطبيّة للعلاج.

إذا تناولت عن طريق الخطأ أكثر مما أنت قد تشعر بأعراض تسمم خطيرة التي تشمل دوار، نعاس، ارتباك، هذيان (هلوسات – رؤية أو سماع أمور غير موجودة) والإيمان بأمر غير صحيحة (أوهام)، قلق أو جنون الشك (زيادة في القلق أو الخوف).
تغييرات في وتيرة القلب المحسوبة بضغط دم منخفض (شعور بالدوار عند القيام).

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بإبتلاع/استنشاق كمية من المنتج عن طريق الخطأ فتوجّه، فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عبلة الدواء معك. بعد تناول مفرط، يجب الالتقاء بالطبيب بهدف إجراء مراقبة. يُمنَع التسبّب بتقيؤ بدون تصريح واضح من الطبيب.

إذا نسيت تناول المنتج في الوقت المحدد، يُمنَع تناول جرعة مضاعفة. خذ الجرعة التالية في الوقت المعتاد واستشر الطبيب.

يجب الاستمرار في تناول الدواء حسب توصية الطبيب.

حياة المنتج ومكان الاستعمال:

يجب على المتعالج حمل الرخصة معه سوياً مع عبوة المُنتَج الأصلية بكمية لا تزيد عن عبوة واحدة أو أكثر من الكمية الشهرية المسموح بها بحسب الرخصة (الأقل من بينهما).

يُمنَع الاستعمال بوجود قاصرين.

يُمنَع حمل المنتج إلى خارج البلاد أو استعماله في مناطق جرمك/مطارات وموانئ.

عند المحوِث في المستشفى – يمكن الاستعمال فقط بعد موافقة الطاقم الطبي وفي المكان المُصادق عليه من قبل الطاقم.

التوقف عن الاستعمال:

يجب استشارة الطبيب قبل اتخاذ القرار بإيقاف استعمال القنب بعد استعمال ثابت.

التوقف الفجائي عن الاستعمال قد يؤثر على النوم، الشهية أو الأحاسيس. من المحتمل ظهور أعراض انسحاب وقطام التي تشمل: تعبمل، عصبية، صداع، قلق، اكتئاب، حد تحفيز منخفض، صعوبات في التركيز، قلة نوم، اضطرابات في الشهية، الرغبة في استعمال المخدر. لذلك، ومن أجل منع أعراض الانسحاب والقطام والضيّق، عند اتخاذ القرار في إيقاف العلاج باللقب، سرّشدك الطبيب في كيفية تقليص الاستعمال بصورة تدريجيّة حتى التوقف التام عن الاستعمال.
يُمنَع تناول الأدوية في الظلام! تحقّق من الملمصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كلّ مرّة تتناول فيها دواء.
ضع التعليمات الطبيّة إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال المنتج فاستشيري الطبيب أو الصيدليّ.

4. الأعراض الجانبية

استعمال القنب قد يسبّب أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تصدم عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أيّ منها. أغلب الأعراض الجانبية ستتوقف بعد التأقلم الأوليّ للمُنتَج.

أعراض جانبية شائعة:

- ضعف، دوار أو شعور بالتلحلق
- نبض غير ثابت، تسارع دقات القلب
- انخفاض في مستوى السكر و/أو في ضغط الدم
- شهية متزايدة
- خلل في التناسق، انعدام الثبات، ضرر في التركيز
- تعب وشعور بالنعاس

أعراض جانبية عند الاستعمال الطويل/المُرّمن:

- تعلق، إدمان أو إساءة الاستعمال.
- انخفاض في الهورمونات برولاكتين، LH، FSH، و GH.
- اضطرابات في توازن الإلكتروليتات. مطلوب الحيطه والحذر لدى المرضى الذين يعانون من قصور الكلى.
- اضطرابات ذهانية لدى متعالمين مع ماضٍ شخصي أو تاريخ عائلي مع هذه الأعراض.

أعراض جانبية إضافية المذكورة في الكتب العلمية وشيوعا غير معروف:

رد فعل تحسّسيّ، التهاب مفاصل كانابينويد، اضطرابات في نظم القلب، قصور في القلب، انخفاض حرارة الجسم وفي الحركة، وفي حالات نادرة حتى شلل. هوس خفيف (فقدان قدرة الحكم، وسلوك سيّيف).

أعراض جانبية النابعة عادة من فرط في الجرعة، التي تقتضي اهتمامًا خاصًا:

فقدان الوعي، تغييرات كبيرة في ضغط الدم، في النبض، في مستوى السكر في الدم أو في وتيرة التنفس. جرعة كبيرة من هذا المُنتَج ممكن، في حالات معينة، لدى أشخاص ذات ميل مسبق، أن تؤدي إلى هيجان مؤقت لحالات ذهان، قلق أو هلوسة.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من أعراض جانبية. غير مذكورة في النشرة الطبية يجب عليك مراجعة الطاقم الطبي.

5. كيف يُخزّن المُنتَج؟

- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا المنتج، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد وأو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات مريضة من الطبيب.
- يُمنَع تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحيّة (exp. date) الظاهر على العبوة/الملمّصق. تاريخ انتهاء الصلاحيّة ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين

- يجب تخزين المنتج في عبوة/قنينة محكمة الإغلاق، في مكان مظلم وجاف، في درجة حرارة أقل من 25°C.
- خلاصة زيت القنب صالحة للاستعمال لفترة تتراوح الشهر من يوم فتح القنينة.
- يُمنَع إلقاء منتج القنب في سلّة المهملات أو في مياه الصرف الصحيّ. قم باستشارة الصيدليّ بالنسبة إلى كيفية التخلّص من هذا المنتج الذي لم تعد تستعمله.
- يُمنَع تخزين ادوية/منتجات طبية أخرى في نفس العبوة.

6. معلومات إضافية

المنتج: بازيلت نحوشتان م.ض، ص.ب، 156، أور عكيفا.

بازيلت فارما

مركز إرشاد طبري: 072-22-11-500

info@bazelet-n.com

موقع إترنت: www.femmican.co.il

مواقفة وزارة الصحة

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. مع هذا فالمُنتَج معدّ لكلا الجنسين.

Method of use:

Cannabis Medical Oil

- Use the oil after a light meal (fruit or small snack) to prevent reduced sugar levels.
- Drip the desired amount of drops into a teaspoon. Hold the bottle vertically (90 degrees) to the spoon for accurate dripping. Cannabis oil is a viscous liquid and may drip relatively slow.
- Insert the spoon into the mouth under the tongue and slowly remove it.
- After this wait 1-2 minutes before swallowing to allow the oil to be efficiently absorbed.
- Wait about 15 minutes before drinking or eating. The effect should be felt after about half an hour to an hour.

It is possible that the medical benefit will be felt only after a few weeks and therefore a continuum of treatment is important.

Common dose is about 3-4 times a day. It is possible that the number of drops in each dose will vary according to the medical condition or the type and concentration of the oil.

If you have accidently taken a higher dosage you may experience severe poisoning effects including dizziness, sleepiness, confusion, hallucinations (seeing or hearing things that are not there), delusions (believing in things that are untrue), anxiety or paranoia (increased anxiety or fearfulness), changes in heart rate associated with low blood pressure (feeling dizzy when getting up).
If you have taken an overdose, or if a child has accidentally swallowed/inhaled some medicine, go immediately to a doctor or hospital emergency room and bring the product package with you. After an overdose you must see a doctor for follow-up.

Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by a doctor.

If you forget to take the product at the scheduled time, do not take a double dose. Take the next dose at the usual time and consult your doctor.

Adhere to the treatment as recommended by your doctor.

If you need to stop taking the product:

Consult your doctor before you decide to stop taking cannabis after you have used it regularly.
Discontinuing this treatment suddenly may affect your sleep, appetite, or emotions. You may experience withdrawing symptoms, including: agitation, irritability, headache, anxiety, depression, low stimulation threshold, difficulty concentrating, insomnia, appetite disorders, craving for the drug.
Therefore, to prevent withdrawal symptoms and distress following a decision to stop your cannabis treatment, your doctor will instruct you how to gradually reduce your use until you stop completely.

Do not use this product in the dark! Check the label and the dose each time you use this product. Wear glasses if you need them.

If you have any further questions about using this product, consult your doctor or pharmacist.

4. Side effects

Using cannabis may cause side effects in some people. Do not be alarmed by this list of side effects. You may not experience any of them.

Additional side effects: Common side effects

- Dizziness or a feeling of levitation ("high").
- Unstable heartbeat, heart palpitations.
- Decreased glucose and /or blood pressure.
- Increased appetite.
- Poor coordination, instability, and concentration impairment.
- Fatigue and drowsiness or weakness.
- Changes in perception of time and space, short-term memory loss.
- Changing mood, anxiety.
- Cough and sore throat.
- Dryness and redness in the eyes.
- Headaches.
- Abdominal pain, digestive (vomiting and diarrhea).

Chronic long use side effects

- Dependence, addiction or abuse.
- Decreased hormone levels: prolactin, LH, FSH, and GH.
- Electrolyte balance disorders. Caution is required in patients with renal failure.
- Psychotic disorders in patients with a personal history or family history of these symptoms. These effects usually disappear after a short time when you become accustomed to the product. Regular use of large quantities may cause permanent damage to your cognitive abilities.

Side effects of unknown frequency that are described in the literature:
Allergic reaction, Cannabinoid arthritis, Heart rhythm disorders, Congestive heart failure
Decrease in body temperature and in body movement, and, in rare cases, paralysis
Hypomania (loss of ability to make rational decisions and irresponsible behavior).

Side effects that are usually caused by overdose and that require special attention:
Fainting, significant changes in your blood pressure, blood sugar levels, or breathing rate. In some cases and in people with a tendency, a high dose of this product, may cause a temporary outburst of psychotic episodes, anxiety, and hallucinations

If you experience any side effect, if any side effect gets worse, or if you experience a side effect not mentioned in this leaflet, consult your doctor.

5. How to store this product?

- Prevent poisoning! To prevent poisoning, keep this, and all other medicines, in a closed place out of reach of children and/or infants. Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by a doctor.
- Do not use the product after the expiry date (exp. date) stated on the package/label. The expiry date refers to the last day of that month.

Storage conditions

- Store products for smoking or vaporization in a well-sealed package, in a dark and dry place at a temperature lower than 25°C.
- Cannabis oil extract is best used within one month of first opening.
- Do not throw away any cannabis product via wastewater or household waste. Ask the dispensing pharmacist how to throw away this product when you are not using it any more.
- Do not store in the same package with other medicines/medicinal products.

6. Additional information

Manufacturer: Bazelet Nechushtan LTD. PO Box: 156, Or Akiva

National Training Center

Tel: 072-22-11-500

Mail: info@bazelet-n.com

Website: www.femmican.co.il

Approved by Ministry of Health

- Medicines with a sympathomimetic effect** (including medicines for local eye or nose treatment that can potentially be absorbed in the body) - There may be a greater risk of tachycardia (fast heart rate) or increased blood pressure.
- Anticoagulants that contain warfarin (Coumadin)** - INR values may increase.

Local medicines for reducing pressure inside the eye (glaucoma).

- Medicines for increasing sexual function** - May increase the risk of heart-attack.
- Antibiotics for skin infections** - fusidic acid.
- HIV medicines.**
- Epilepsy medicines** - valproate, topiramate, rufinamide, clobazam, zonisamide, eslicarbazepine.

Medicines with anticholinergic effects (such as tricyclic antidepressants, antihistamines used to treat allergy) - There may be an increased chance of tachycardia, dizziness, and mania.

- Azelastine** - For allergy in the eye.

Amphetamines or amphetamine derivatives - medicines for slimming, attention disorders, and dental treatment (adrenalin which is sometimes used as an anesthetic) - may cause a rise in blood pressure and rapid heart rate.

- Drugs that have an effect on immune system suppression, **biological drugs or immunological drugs.**

Other medicines that may affect or may be affected by the breakdown of cannabis in the body:
barbiturates, carbamazepine, enzalutamide, phenobarbital, phenytoin, primidone, rifabutin, rifampin, hypericum, clarithromycin, cyclosporine, darunavir, erythromycin, itraconazole, ketoconazole, lopinavir, mifepristone, ombitasvir, paritaprevir, ritonavir, saquinavir, verapamil, voriconazole, amiodarone, clopidogrel, flucanazole, fluorouracil, metronidazole, sulfamethoxazole, chloramphenicol, efavirenz, esomeprazole, floxetine, fluvoxamine, isoniazid, modafinil, omeprazole, oxcarbazepine, theophylline, caffeine, clozapine, duloxetine, estradiol, estrogen, lidocaine, melatonin, mexiletine, mirtazapine, olanzapine, propranolol, rasagiline, ropinrole, triamterene, zolmitriptan.

The information about combining medical cannabis with medicines is not yet sufficiently based on proper medical studies. So, whenever you encounter a side effect that might be the result of a combination of some medicine with medical cannabis, you are advised to report this to your doctor and be more careful.
If you are taking any medication, do not discontinue or change it without doctor advice.

Using this product and food

- Do not drink grapefruit juice while you are taking cannabis.
- Eating a light meal is recommended 30 minutes after taking the product.
- Cannabis may cause your blood sugar level to drop and make you feel tired and dizzy. It is advised not to take it on empty stomach. You are advised to have with you a snack or sweet, or sweetened soft drink **before** you take the product.

Using this medicine and alcohol consumption

Do not drink wine or any other alcoholic beverages during treatment with cannabis, particularly when you start treatment or when the product is changed or your dose is modified. Drinking alcoholic beverages during treatment with cannabis may increase certain effects such as loss of balance or reduced reaction-time. This can impair your ability to drive and operate machines and increase your risk of falling and other accidents.

P